

CONSEJOS PARA NIÑOS



FreeStyle
Libre 3


Recuerda estas cosas importantes:



El sensor tiene que ir en la parte posterior superior de mi brazo.



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor cuando veo  durante las primeras 12 horas de uso de un sensor.



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor si creo que el número no coincide con cómo me siento.



Si tomo insulina para una comida, no debo tomar más insulina durante 2 horas. Necesito esperar y mirar.




2 HORAS

¡Advertencia!

La aplicación solo debe usarse para obtener datos de glucosa de su sensor. Si la aplicación se utiliza para obtener datos de glucosa del sensor de otra persona, los datos de glucosa pueden confundirse.

¡Importante!

- Mientras utilice un sensor FreeStyle Libre 3, no tome más de 500 mg de vitamina C al día.
- Mientras utilice un sensor FreeStyle Libre 3 Plus, no tome más de 1000 mg de vitamina C al día.
- Tomar más de estos niveles puede afectar las lecturas del sensor. Algunos suplementos como Airborne® y Emergen-C® contienen 1000 mg de vitamina C.



Mi lector

Esta flecha me muestra en qué dirección va mi glucosa

Mis resultados de glucosa de las últimas 12 horas



Mi teléfono